

**Tabella 1. Sintomi e segni uro-genitali**

Sintomi e segni	Sospetta neoplasia	Raccomandazione	Timing
<b>Disfunzione erettile</b>			
Disfunzione erettile	Prostata	Considerare il test del PSA e l'esplorazione rettale [1.6.2]	Accesso diretto
<b>Disuria</b>			
Disuria associata a microematuria inspiegata in persone di età ≥60 anni	Vescica	Richiedere consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.6.4]	Entro 2 settimane
<b>Ematuria</b>			
Macroematuria inspiegata associata a anemia o trombocitosi o iperglicemia o perdite vaginali in donne ≥ 55 anni	Endometrio	Richiedere un'ecografia [1.5.12]	Accesso diretto
Macroematuria inspiegata non associata a IVU o che persiste o si ripresenta dopo un'IVU trattata con successo, in persone di età ≥ 45 anni	Vescica o rene	Richiedere consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.6.4] [1.6.6]	Entro 2 settimane
Macroematuria nell'uomo	Prostata	Considerare il test del PSA e l'esplorazione rettale [1.6.2]	Accesso diretto
Microematuria di origine sconosciuta con disuria o aumento del valore di globuli bianchi nel sangue in persone di età ≥ 60 anni	Vescica	Richiedere consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.6.4]	Entro 2 settimane
<b>Sintomi delle basse vie urinarie</b>			
Inspiegate infezioni delle vie urinarie ricorrenti o persistenti in persone di età ≥ 60 anni	Vescica	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.6.5]	Differibile
Nicturia, minzione urgente, disuria, incontinenza o ritenzione urinaria negli uomini	Prostata	Considerare il test del PSA e l'esplorazione rettale [1.6.2]	Accesso diretto
Pollachiuria e/o minzione urgente persistente o frequente (> 12 volte/mese) nelle donne, in particolare di età ≥50 anni	Ovaio	Richiedere test diagnostici* [1.5.2] Richiedere il CA125* [1.5.6]	Accesso diretto
<b>Sintomi segni testicolari</b>			
Aumento di volume del testicolo o cambiamento di forma o struttura (non dolente)	Testicolo	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.6.7]	Entro 2 settimane
Sintomi ai testicoli inspiegati o persistenti	Testicolo	Considerare un'ecografia [1.6.8]	Accesso diretto

\*Le raccomandazioni per il carcinoma ovarico si applicano alle donne di età ≥18 anni.