

**Tabella 11. Sintomi e segni specifici**

Sintomi e segni	Sospetta neoplasia	Raccomandazione	Timing
<b>Astenia</b>			
Astenia inspiegata associata a tosse o respiro corto o dolore toracico o calo ponderale inspiegati in persone di età ≥40 anni	Polmone o mesotelioma	Richiedere una Rx torace [1.1.2] [1.1.5]	Entro 2 settimane
Astenia inspiegata in persone di età ≥40 anni che sono stati esposti all'asbesto	Mesotelioma	Richiedere una Rx torace [1.1.5]	Entro 2 settimane
Astenia inspiegata in fumatori o ex-fumatori di età ≥40 anni	Polmone o mesotelioma	Richiedere una Rx torace [1.1.2] [1.1.5]	Entro 2 settimane
Astenia inspiegata nelle donne	Ovaio	Richiedere test diagnostici* [1.5.2] Richiedere il CA125* [1.5.6]	Accesso diretto
<b>Calo ponderale</b>			
Calo ponderale associato a diarrea o lombalgia o dolore addominale o nausea o vomito o stitichezza o diabete di recente insorgenza in persone di età ≥60 anni	Pancreas	Considerare una TAC o, se non disponibile, un'ecografia [1.2.5]	Entro 2 settimane
Calo ponderale associato a dolore epigastrico o reflusso gastro-esofageo o dispepsia in persone di età ≥55 anni	Esofago o stomaco	Richiedere un'endoscopia del tratto gastrointestinale superiore [1.2.1] [1.2.7]	Entro 2 settimane
Calo ponderale associato a linfadenopatia inspiegata negli adulti	Linfoma di Hodgkin o non-Hodgkin	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia, tenendo conto di eventuali sintomi associati [1.10.8] [1.10.10]	Entro 2 settimane
Calo ponderale associato a splenomegalia inspiegata negli adulti	Linfoma non-Hodgkin	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia, tenendo conto di eventuali sintomi associati [1.10.8]	Entro 2 settimane
Calo ponderale associato a tosse o astenia o respiro corto o dolore toracico o perdita di appetito inspiegati in persone di età ≥40 anni con nessuna storia di fumo	Polmone o mesotelioma	Richiedere una Rx torace [1.1.2] [1.1.5]	Entro 2 settimane
Calo ponderale associato a trombocitosi o nausea o vomito in persone di età ≥55 anni	Esofago o stomaco	Considerare un'endoscopia del tratto gastrointestinale superiore [1.2.3] [1.2.9]	Differibile
Calo ponderale inspiegato	Colon-retto, esofago, stomaco, polmone, prostata, pancreas, vie urinarie	Valutare ulteriori sintomi, segni o dati clinici utili a chiarire la neoplasia più probabile [1.13.2]	-
		Richiedere test diagnostici o consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.13.2]	Entro 2 settimane
Calo ponderale inspiegato associato a dolore addominale in persone di età ≥40 anni	Colon-retto	Richiedere un consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.3.1]	Entro 2 settimane
Calo ponderale inspiegato associato a rettorragia negli adulti di età <50 anni	Colon-retto	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.3.3]	Entro 2 settimane
Calo ponderale inspiegato in fumatori o ex-fumatori di età >40 anni	Polmone o mesotelioma	Richiedere una Rx torace [1.1.2] [1.1.5]	Entro 2 settimane
Calo ponderale inspiegato in persone di età ≥40 anni che sono stati esposti all'asbesto	Mesotelioma	Richiedere una Rx torace [1.1.5]	Entro 2 settimane
Calo ponderale inspiegato nelle donne	Ovarico	Considerare test diagnostici* [1.5.3] Richiedere il CA125* [1.5.6]	Accesso diretto
Calo ponderale inspiegato non associato a rettorragia in persone adulti di età ≥50 anni	Colon-retto	Richiedere il test per la ricerca del sangue occulto nelle feci [1.3.4]	Accesso diretto

\*Le raccomandazioni per il carcinoma ovarico si applicano alle donne di età ≥18 anni.

**Tabella 11. Sintomi e segni specifici (segue)**

Sintomi e segni	Sospetta neoplasia	Raccomandazione	Timing
<b>Diabete</b>			
Diabete di recente insorgenza associato a calo ponderale in persone di età ≥60 anni	Pancreas	Considerare una TAC o, se non disponibile, un'ecografia [1.2.5]	Entro 2 settimane
<b>Febbre</b>			
Febbre associata a linfadenopatia inspiegata negli adulti	Linfoma di Hodgkin o non-Hodgkin	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia, tenendo conto di eventuali sintomi associati [1.10.10]	Entro 2 settimane
Febbre associata a splenomegalia inspiegata negli adulti	Linfoma non-Hodgkin	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia, tenendo conto di eventuali sintomi associati [1.10.8]	Entro 2 settimane
Febbre inspiegata	Leucemia	Considerare un emocromo completo con formula [1.10.1]	Entro 48 ore
<b>Infezioni</b>			
Infezione inspiegata persistente o ricorrente negli adulti	Leucemia	Considerare un emocromo completo con formula [1.10.1]	Entro 48 ore
<b>Pallore</b>			
Pallore	Leucemia	Considerare un emocromo completo con formula [1.10.1]	Entro 48 ore
<b>Perdita di appetito o sensazione di sazietà precoce</b>			
Perdita di appetito inspiegata	Polmone, esofago, stomaco, colon-retto, pancreas, colecisti, rene	Valutare ulteriori sintomi, segni o dati clinici utili a chiarire la neoplasia più probabile [1.13.3]	-
		Richiedere test diagnostici o consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.13.3]	Entro 2 settimane
Perdita di appetito inspiegata associata a tosse o astenia o respiro corto o dolore toracico o calo ponderale inspiegati in persone di età ≥40 anni	Polmone o mesotelioma	Richiedere una Rx torace [1.1.2] [1.1.5]	Entro 2 settimane
Perdita di appetito inspiegata in persone di età ≥40 anni che sono stati esposti all'asbesto	Mesotelioma	Richiedere una Rx torace [1.1.5]	Entro 2 settimane
Perdita di appetito inspiegata in persone non fumatori di età ≥40 anni	Polmone o mesotelioma	Richiedere una Rx torace [1.1.2] [1.1.5]	Entro 2 settimane
Perdita di appetito o sensazione di sazietà precoce persistente o frequente (in particolare >12 volte/mese) nelle donne, specialmente se di età ≥50 anni	Ovaio	Richiedere test diagnostici* [1.5.2] Richiedere il CA125* [1.5.6]	
<b>Prurito</b>			
Prurito associato a linfadenopatia inspiegata negli adulti	Linfoma di Hodgkin o non-Hodgkin	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia, tenendo conto di eventuali sintomi associati [1.10.10]	Entro 2 settimane
Prurito associato a splenomegalia inspiegata negli adulti	Linfoma non-Hodgkin	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia, tenendo conto di eventuali sintomi associati [1.10.8]	Entro 2 settimane
<b>Sudorazione notturna</b>			
Sudorazione notturna associata a linfadenopatia inspiegata negli adulti	Linfoma di Hodgkin o non-Hodgkin	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia, tenendo conto di eventuali sintomi associati [1.10.8]	Entro 2 settimane
Sudorazione notturna associata a splenomegalia inspiegata negli adulti	Linfoma non-Hodgkin	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia, tenendo conto di eventuali sintomi associati [1.10.10]	Entro 2 settimane
<b>Trombosi venosa profonda</b>			
Trombosi venosa profonda	Vie urinarie, apparato genitale, mammella, colon-retto, polmone	Valutare ulteriori sintomi, segni o dati clinici utili a chiarire la neoplasia più probabile [1.13.3]	-
		Considerare test diagnostici o consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.13.4]	Entro 2 settimane

\*Le raccomandazioni per il carcinoma ovarico si applicano alle donne di età ≥18 anni.