

Tabella 3. Manifestazioni emorragiche*

Sintomi e segni	Sospetta neoplasia	Raccomandazione	Timing
Ematemesi			
Ematemesi	Esofago o stomaco	Richiedere un'endoscopia del tratto gastrointestinale superiore [1.2.2] [1.2.8]	Entro 48 ore
Emottisi			
Emottisi inspiegata in persone di età ≥40 anni	Polmone	Richiedere un consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.1.1]	Entro 2 settimane
Metrorragia post-menopausale			
Metrorragia [§] in donne di età ≥55 anni	Endometrio	Richiedere un consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.5.10]	Entro 2 settimane
Metrorragia [§] in donne di età <55 anni	Endometrio	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.5.11]	Entro 2 settimane
Retrorragia			
Retrorragia associata a dolore addominale o cambiamento nella funzionalità intestinale o calo ponderale o anemia sideropenica in persone di età ≤50 anni	Colon-retto	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.3.3]	Entro 2 settimane
Retrorragia inspiegata in persone di età ≥50 anni	Colon-retto	Richiedere un consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.3.11]	Entro 2 settimane
Sanguinamento, ematomi, ecchimosi o petecchie			
Sanguinamento, ematomi, ecchimosi o petecchie inspiegati	Leucemia	Considerare un emocromo completo [1.10.1]	Entro 48 ore
Sanguinamento vulvare			
Sanguinamento vulvare inspiegato	Vulva	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.5.14]	Entro 2 settimane

*Cfr. anche tabella 1 per l'ematuria e tabella 12 per la ricerca del sangue occulto nelle feci.

[§]Emorragia vaginale inspiegata dopo almeno 1 anno dalla cessazione delle mestruazioni per menopausa.