

Tabella 6. Lesioni cutanee*

Sintomi e segni	Sospetta neoplasia	Raccomandazione	Timing
Alterazioni cutanee suggestive di carcinoma mammario	Mammella	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.4.2]	Entro 2 settimane
Alterazioni rilevanti in un solo capezzolo tra cui retrazione e secrezione in persone di età ≥50 anni	Mammella	Richiedere un consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.4.1]	Entro 2 settimane
Ematomi o ecchimosi inspiegati	Leucemia	Considerare un emocromo completo con formula [1.10.1]	Entro 48 ore
Lesione cutanea pigmentata o non pigmentata suggestiva di un melanoma nodulare	Melanoma	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.7.3]	Entro 2 settimane
Lesione cutanea pigmentata, sospetta con uno score >3 secondo una checklist ponderata a 7 punti	Melanoma	Richiedere un consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.7.1]	Entro 2 settimane
Lesione cutanea suggestiva di carcinoma basocellulare [§]	Carcinoma basocellulare	Considerare un consulto specialistico [1.7.5]	Accesso diretto
		Considerare un consulto specialistico nelle persone con una lesione cutanea che suggerisce la presenza di un carcinoma basocellulare solo se la sede o le dimensioni della lesione suggeriscono di non ritardare la diagnosi [1.7.6]	Entro 2 settimane
Lesione cutanea suggestiva di un tumore a cellule squamose	Carcinoma squamocellulare	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.7.4]	Entro 2 settimane
Macchia rossa o rossa e bianca nel cavo orale compatibile con eritroplachia o eritroleucoplachia	Orale	Considerare un consulto specialistico odontostomatologico per sospetta neoplasia [1.8.3]	Entro 2 settimane
Massa a livello del pene non conseguente a infezione sessualmente trasmessa	Pene	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.6.9]	Entro 2 settimane
Massa vulvare inspiegata	Vulva	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.5.14]	Entro 2 settimane
Pallore	Leucemia	Considerare un emocromo completo con formula [1.10.1]	Entro 48 ore
Petecchie inspiegate negli adulti	Leucemia	Considerare un emocromo completo con formula [1.10.1]	Entro 48 ore
Prurito associato a linfadenopatia inspiegata negli adulti	Linfoma di Hodgkin o non-Hodgkin	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia, tenendo conto di eventuali sintomi associati [1.10.10]	Entro 2 settimane
Prurito associato a splenomegalia inspiegata negli adulti	Linfoma non-Hodgkin	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia, tenendo conto di eventuali sintomi associati [1.10.8]	Entro 2 settimane
Sintomi inspiegati o persistenti al glande o al prepuzio	Pene	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.6.10]	Entro 2 settimane
Ulcera anale inspiegata	Ano	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.3.5]	Entro 2 settimane
Ulcera del pene non conseguente a infezione sessualmente trasmessa	Pene	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.6.9]	Entro 2 settimane

*Cfr. anche tabella 9 per lesioni del cavo orale.

[§]Le caratteristiche tipiche di un carcinoma basocellulare comprendono: ulcera con bordo rialzato e arrotondato; sottili vasi sanguigni prominenti intorno alla lesione; oppure un nodulo cutaneo (in particolare noduli perlacei o cerei).