

**Tabella 8. Sintomi e segni respiratori**

Sintomi e segni	Sospetta neoplasia	Raccomandazione	Timing
<b>Dolore toracico</b>			
Dolore toracico inspiegato associato a tosse o astenia o respiro corto o calo ponderale o perdita di appetito inspiegati in persone di età ≥40 anni	Polmone o mesotelioma	Richiedere una RX torace [1.1.2] [1.1.5]	Entro 2 settimane
Dolore toracico inspiegato in persone di età ≥40 anni che sono stati esposti all'asbesto	Mesotelioma	Richiedere una RX torace [1.1.5]	Entro 2 settimane
Dolore toracico inspiegato in fumatori o ex-fumatori età ≥40 anni	Polmone o mesotelioma	Richiedere una Rx torace [1.1.2] [1.1.5]	Entro 2 settimane
<b>Esame obiettivo del torace</b>			
Dita a bacchetto di tamburo in persone di età ≥40 anni	Mesotelioma	Considerare una Rx torace [1.1.3] [1.1.6]	Entro 2 settimane
Segni toracici compatibili con tumore polmonare in persone di età ≥40 anni	Polmone	Considerare una Rx torace [1.1.3]	Entro 2 settimane
Segni toracici compatibili con una patologia pleurica in persone di età ≥40 anni	Polmone	Considerare una Rx torace [1.1.6]	Entro 2 settimane
<b>Infezioni polmonari</b>			
Bronco-polmonite ricorrente o persistente in persone di età ≥40 anni	Polmone	Considerare una Rx torace [1.1.3]	Entro 2 settimane
<b>Raucedine</b>			
Raucedine persistente e inspiegabile in persone di età ≥45	Laringe	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.8.1]	Entro 2 settimane
<b>Respiro corto</b>			
Respiro corto associato a splenomegalia inspiegata negli adulti	Linfoma non-Hodgkin	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia, tenendo conto di eventuali sintomi associati [1.10.8]	Entro 2 settimane
Respiro corto associato a tosse o astenia o dolore toracico o calo ponderale o perdita di appetito inspiegati in persone di età ≥40 anni	Polmone o mesotelioma	Richiedere una Rx torace [1.1.2] [1.1.5]	Entro 2 settimane
Respiro corto e linfadenopatia inspiegate negli adulti	Linfoma di Hodgkin o non-Hodgkin	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia, tenendo conto di eventuali sintomi associati [1.10.8]	Entro 2 settimane
Respiro corto inspiegato in persone di età ≥40 anni con storia di esposizione all'asbesto	Mesotelioma	Richiedere una Rx torace [1.1.5]	Entro 2 settimane
Respiro corto inspiegato in fumatori o ex-fumatori di età ≥40 anni	Polmone o mesotelioma	Richiedere una Rx torace [1.1.2] [1.1.5]	Entro 2 settimane
<b>Tosse</b>			
Tosse in fumatori o ex-fumatori di età ≥40 anni	Polmone o mesotelioma	Richiedere una Rx torace [1.1.2] [1.1.5]	Entro 2 settimane
Tosse inspiegata associata ad astenia o respiro corto o dolore toracico o calo ponderale o perdita di appetito inspiegati in persone di età ≥40 anni	Polmone o mesotelioma	Richiedere una Rx torace [1.1.2] [1.1.5]	Entro 2 settimane
Tosse inspiegata in persone di età ≥40 anni con storia di esposizione all'asbesto	Mesotelioma	Richiedere una Rx torace [1.1.5]	Entro 2 settimane