

Tabella 9. Noduli o masse*

Sintomi e segni	Sospetta neoplasia	Raccomandazione	Timing
Lesioni del cavo orale			
Neoformazione del labbro o del cavo orale	Cavo orale	Considerare un consulto specialistico odontostomatologico per sospetta neoplasia [1.8.3]	Entro 2 settimane
Ulcere inspiegate nel cavo orale che persistono da oltre 3 settimane	Cavo orale	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.8.2]	Entro 2 settimane
Linfoadenopatie			
Linfoadenopatia generalizzata negli adulti	Leucemia	Considerare un emocromo completo con formula [1.10.1]	Entro 48 ore
Linfoadenopatia inspiegata negli adulti	Linfoma di Hodgkin o non-Hodgkin	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia, tenendo conto di eventuali sintomi associati [1.10.8] [1.10.10]	Entro 2 settimane
Linfoadenopatia sovra-clavicolare o cervicale persistente in persone di età ≥40 anni	Polmone	Considerare una Rx torace [1.1.3]	Entro 2 settimane
Noduli e masse			
Massa a livello del pene non conseguente a infezione sessualmente trasmessa	Pene	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.6.9]	Entro 2 settimane
Massa anale inspiegata	Ano	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.3.5]	Entro 2 settimane
Massa palpabile inspiegata all'introito o all'interno della vagina	Vagina	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.5.15]	Entro 2 settimane
Massa vulvare inspiegata	Vulva	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.5.14]	Entro 2 settimane
Neoformazione del labbro o del cavo orale	Cavo orale	Considerare un consulto specialistico odontostomatologico per sospetta neoplasia [1.8.3]	Entro 2 settimane
Nodulo ascellare inspiegato in persone di età ≥30 anni	Mammella	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.4.2]	Entro 2 settimane
Nodulo inspiegato nel collo in persone di età ≥45 anni	Laringe	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.8.1]	Entro 2 settimane
Nodulo inspiegato persistente nel collo	Cavo orale	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.8.2]	Entro 2 settimane
Nodulo mammario inspiegato associato o meno a dolore in persone di età ≥30 anni	Mammella	Richiedere un consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.4.1]	Entro 2 settimane
Nodulo mammario inspiegato associato o meno a dolore in persone di età <30 anni	Mammella	Considerare un consulto specialistico [1.4.3]	Differibile
Nodulo/massa inspiegato che aumenta progressivamente di dimensione negli adulti	Sarcoma dei tessuti molli	Considerare un'ecografia [1.11.4]	Entro 2 settimane
Nodulo tiroideo inspiegato	Tiroide	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.8.5]	Entro 2 settimane

*Cfr. anche tabella 4 per noduli o masse addominali, anali, pelvici o rettali.