

**Tabella 13. Sintomi e segni nei bambini e nei giovani**

Sintomi e segni	Sospetta neoplasia	Raccomandazione	Timing
<b>Noduli o masse</b>			
Linfoadenopatia generalizzata in bambini e giovani	Leucemia	Richiedere un emocromo completo con formula [1.10.3]	Entro 48 ore
Linfoadenopatia inspiegata in bambini e giovani	Linfoma di Hodgkin e non-Hodgkin	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia, tenendo conto di eventuali sintomi associati [1.10.9] [1.10.11]	Entro 48 ore
Nodulo o massa inspiegati che aumenta progressivamente di dimensione in bambini e giovani	Sarcoma dei tessuti molli	Considerare un'ecografia [1.11.6]	Entro 48 ore
<b>Preoccupazioni di familiari e caregiver</b>			
Intuizioni, persistenti preoccupazioni e ansia di familiari e caregiver per la sintomatologia del bambino/giovane	Tumore in età pediatrica	Tenere conto delle intuizioni e conoscenze di genitori e caregiver quando si considera un consulto specialistico per sospetta neoplasia in bambini o giovani. Considerare un consulto specialistico se il genitore o caregiver ha preoccupazioni o ansie persistenti sui sintomi del bambino, anche se le cause potrebbero più verosimilmente essere di natura benigna [1.13.1]	-
<b>Sanguinamento, ematomi, ecchimosi o eruzioni cutanee</b>			
Petecchie inspiegate in bambini e giovani	Leucemia	Richiedere un consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.10.2]	Immediato
Sanguinamento, ematomi o ecchimosi inspiegati in bambini e giovani	Leucemia	Richiedere un emocromo completo con formula [1.10.3]	Entro 48 ore
<b>Segni cutanei</b>			
Ematomi o ecchimosi inspiegati in bambini e giovani	Leucemia	Richiedere un emocromo completo con formula [1.10.3]	Entro 48 ore
Pallore in bambini e giovani	Leucemia	Richiedere un emocromo completo con formula [1.10.3]	Entro 48 ore
Petecchie inspiegate in bambini e giovani	Leucemia	Richiedere un consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.10.2]	Immediato
<b>Sintomi addominali</b>			
Epatosplenomegalia inspiegata in bambini e giovani	Leucemia	Richiedere un consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.10.2]	Immediato
Massa addominale palpabile estesa o aumento di dimensione di un organo inspiegato nei bambini	Neuroblastoma o tumore di Wilm's	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.12.1] [1.12.3]	Entro 48 ore
Splenomegalia inspiegata in bambini e giovani	Linfoma non-Hodgkin	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia, tenendo conto di eventuali sintomi associati [1.10.9]	Entro 48 ore
<b>Sintomi delle basse vie urinarie</b>			
Macroematuria inspiegata in bambini e giovani	Tumore di Wilm's	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.12.3]	Entro 48 ore
<b>Sintomi neurologici</b>			
Alterata funzione neurologica di origine cerebellare o centrale di recente insorgenza in bambini e giovani	Sistema nervoso centrale	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.9.2]	Entro 48 ore
<b>Sintomi ossei</b>			
Dolore osseo inspiegato in bambini e giovani	Sarcoma osseo	Considerare una Rx [1.11.3]	Entro 48 ore
Dolore osseo persistente o inspiegato in bambini e giovani	Leucemia	Richiedere un emocromo completo con formula [1.10.3]	Entro 48 ore
Tumefazione ossea inspiegata in bambini e giovani	Sarcoma osseo	Considerare una Rx [1.11.3]	Entro 48 ore
<b>Sintomi respiratori</b>			
Respiro corto associato a linfoadenopatia in bambini e giovani	Linfoma di Hodgkin o non-Hodgkin	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia, tenendo conto di eventuali sintomi associati [1.10.9] [1.10.11]	Entro 48 ore
Respiro corto associato a splenomegalia inspiegata in bambini e giovani	Linfoma non-Hodgkin	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia, tenendo conto di eventuali sintomi associati [1.10.9]	Entro 48 ore

**Tabella 13. Sintomi e segni nei bambini e nei giovani (segue)**

Sintomi e segni	Sospetta neoplasia	Raccomandazione	Timing
<b>Sintomi aspecifici</b>			
Astenia persistente in bambini e giovani	Leucemia	Richiedere un emocromo completo con formula [1.10.3]	Entro 48 ore
Calo ponderale associato a linfadenopatia inspiegata in bambini e giovani	Linfoma di Hodgkin o non-Hodgkin	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia, tenendo conto di eventuali sintomi associati [1.10.9] [1.10.11]	Entro 48 ore
Calo ponderale associato a splenomegalia inspiegata in bambini e giovani	Linfoma non-Hodgkin	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia, tenendo conto di eventuali sintomi associati [1.10.9]	Entro 48 ore
Febbre associata a linfadenopatia inspiegata in bambini e giovani	Linfoma di Hodgkin o non-Hodgkin	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia, tenendo conto di eventuali sintomi associati [1.10.9] [1.10.11]	Entro 48 ore
Febbre associata a splenomegalia inspiegata in bambini e giovani	Linfoma non-Hodgkin	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia, tenendo conto di eventuali sintomi associati [1.10.9]	Entro 48 ore
Febbre inspiegata in bambini e giovani	Leucemia	Considerare un emocromo completo con formula [1.10.3]	Entro 48 ore
Infezione inspiegata e persistente in bambini e giovani	Leucemia	Considerare un emocromo completo con formula [1.10.3]	Entro 48 ore
Linfadenopatia generalizzata in bambini e giovani	Leucemia	Considerare un emocromo completo con formula [1.10.3]	Entro 48 ore
Linfadenopatia inspiegata in bambini e giovani	Linfoma di Hodgkin o non-Hodgkin	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia, tenendo conto di eventuali sintomi associati [1.10.9] [1.10.11]	Entro 48 ore
Prurito associato a linfadenopatia inspiegata in bambini e giovani	Linfoma di Hodgkin o non-Hodgkin	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia, tenendo conto di eventuali sintomi associati [1.10.9] [1.10.11]	Entro 48 ore
Prurito associato a splenomegalia inspiegata in bambini e giovani	Linfoma non-Hodgkin	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia, tenendo conto di eventuali sintomi associati [1.10.9]	Entro 48 ore
Sudorazione notturna associata a linfadenopatia inspiegata in bambini e giovani	Linfoma di Hodgkin o non-Hodgkin	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia, tenendo conto di eventuali sintomi associati [1.10.9] [1.10.11]	Entro 48 ore
Sudorazione notturna associata a splenomegalia inspiegata in bambini e giovani	Linfoma non-Hodgkin	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia, tenendo conto di eventuali sintomi associati [1.10.9]	Entro 48 ore