

**Tabella 4. Sintomi e segni addominali\***

Sintomi e segni	Sospetta neoplasia	Raccomandazione	Timing
<b>Alterazioni dell'alvo</b>			
Alterazioni dell'alvo (inspiegato) con rettorragia in adulti di età <50 anni	Colon-retto	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.3.3]	Entro 2 settimane
Alterazioni dell'alvo (inspiegato) in adulti di età ≥60 anni	Colon-retto	Richiedere un consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.3.1]	Entro 2 settimane
Alterazioni dell'alvo (inspiegato) nelle donne	Ovaio	Considerare test diagnostici <sup>§</sup> [1.5.3] Richiedere il CA125 <sup>§</sup> [1.5.6]	Accesso diretto
Alterazioni dell'alvo senza rettorragia in persone di età <60 anni	Colon-retto	Richiedere il test per la ricerca del sangue occulto nelle feci [1.3.4]	Accesso diretto
Diarrea o stipsi con calo ponderale in adulti di età ≥60 anni	Pancreas	Considerare una TAC o, se non disponibile, un'ecografia [1.2.5]	Entro 2 settimane
Sintomi da sindrome dell'intestino irritabile, negli ultimi 12 mesi, in donne di età ≥50 anni	Ovaio	Richiedere test diagnostici appropriati per il carcinoma ovarico, poiché la sindrome dell'intestino irritabile raramente si presenta per la prima volta in donne di questa età <sup>§</sup> [1.5.5] Richiedere il CA125 <sup>§</sup> [1.5.6]	Accesso diretto
<b>Disfagia</b>			
Disfagia	Esofago o stomaco	Richiedere un'endoscopia del tratto gastrointestinale superiore [1.2.1] [1.2.7]	Entro 2 settimane
<b>Dispepsia</b>			
Dispepsia con calo ponderale in persone di età ≥55 anni	Esofago o stomaco	Richiedere un'endoscopia del tratto gastrointestinale superiore [1.2.1] [1.2.7]	Entro 2 settimane
Dispepsia con trombocitosi o nausea o vomito in persone di età ≥55 anni	Esofago o stomaco	Considerare un'endoscopia del tratto gastrointestinale superiore [1.2.9]	Differibile
Dispepsia resistente alla terapia, in persone di età ≥55 anni	Esofago o stomaco	Considerare un'endoscopia del tratto gastrointestinale superiore [1.2.3] [1.2.9]	Differibile
<b>Distensione addominale</b>			
Distensione addominale persistente o frequente (in particolare >12 volte/mese) specialmente nelle donne di età ≥50 anni	Ovaio	Richiedere test diagnostici <sup>§</sup> [1.5.2] Richiedere il CA125 <sup>§</sup> [1.5.6]	Accesso diretto
<b>Dolore addominale o pelvico</b>			
Dolore addominale con calo ponderale inspiegato in adulti di età ≥40 anni	Colon-retto	Richiedere un consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.3.1]	Entro 2 settimane
Dolore addominale con rettorragia inspiegata in adulti di età <50 anni	Colon-retto	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.3.3]	Entro 2 settimane
Dolore addominale o pelvico (persistente o frequente, in particolare più di 12 volte al mese) nelle donne, specialmente di età ≥50 anni	Ovaio	Richiedere test diagnostici <sup>§</sup> [1.5.2] Richiedere il CA125 <sup>§</sup> [1.5.6]	Accesso diretto
Dolore addominale senza rettorragia in adulti di età ≥50 anni	Colon-retto	Richiedere il test per la ricerca del sangue occulto nelle feci [1.3.4]	Accesso diretto
Dolore ai quadranti superiori dell'addome con anemia o trombocitosi o nausea o vomito in adulti di età ≥55 anni	Esofago o stomaco	Considerare un'endoscopia del tratto gastrointestinale superiore [1.2.3] [1.2.9]	Differibile
Dolore epigastrico con calo ponderale in adulti di età ≥55 anni	Esofago o stomaco	Richiedere un'endoscopia del tratto gastrointestinale superiore [1.2.1] [1.2.7]	Entro 2 settimane
Dolore epigastrico con calo ponderale in adulti di età ≥60 anni	Pancreas	Considerare una TAC o, se non disponibile, un'ecografia [1.2.5]	Entro 2 settimane
Sintomi da sindrome dell'intestino irritabile negli ultimi 12 mesi in donne di età ≥50 anni	Ovaio	Richiedere test diagnostici appropriati per il carcinoma ovarico, poiché la sindrome dell'intestino irritabile raramente si presenta per la prima volta in donne di questa età <sup>§</sup> [1.5.5] Richiedere il CA125 <sup>§</sup> [1.5.6]	Accesso diretto
<b>Esame obiettivo addome</b>			
Ascite e/o massa addominale o pelvica non compatibile con un fibroma uterino	Ovaio	Richiedere un consulto specialistico per sospetta neoplasia <sup>§</sup> [1.5.1]	Entro 2 settimane

\*Cfr. anche tabella 3 per le raccomandazioni sulla rettorragia.

<sup>§</sup>Le raccomandazioni per il carcinoma ovarico si applicano alle donne di età ≥18 anni.

**Tabella 4. Sintomi e segni addominali (segue)**

Sintomi e segni	Sospetta neoplasia	Raccomandazione	Timing
<b>Esplorazione rettale</b>			
Massa o ulcera anale inspiegata	Ano	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.3.5]	Entro 2 settimane
Massa rettale	Colon-retto	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.3.2]	Entro 2 settimane
Parete prostatica con caratteristiche di malignità all'esplorazione rettale	Prostata	Richiedere un consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.6.1]	Entro 2 settimane
<b>Massa addominale, pelvica o rettale o organomegalia</b>			
Epatosplenomegalia	Leucemia	Considerare un emocromo completo [1.10.1]	Entro 48 ore
Massa addominale o pelvica non compatibile con un fibroma uterino	Ovaio	Richiedere consulto specialistico per sospetta neoplasia <sup>§</sup> [1.5.1]	Entro 2 settimane
Massa addominale o rettale	Colon-retto	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.3.2]	Entro 2 settimane
Massa epigastrica palpabile	Stomaco	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia [1.2.6]	Entro 2 settimane
Massa nell'addome superiore compatibile con epatomegalia	Fegato	Considerare un'ecografia [1.2.11]	Entro 2 settimane
Massa nell'addome superiore compatibile con un aumento di volume della colecisti	Colecisti	Considerare un'ecografia [1.2.10]	Entro 2 settimane
Splenomegalia inspiegata negli adulti	Linfoma non-Hodgkin	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia, tenendo conto di eventuali sintomi associati [1.10.8]	Entro 2 settimane
<b>Nausea o vomito</b>			
Nausea o vomito con calo ponderale in persone di età ≥60 anni	Pancreas	Considerare una TAC o, se non disponibile, un'ecografia [1.2.5]	Entro 2 settimane
Nausea o vomito con trombocitosi o calo ponderale o reflusso gastro-esofageo o dispepsia o dolore epigastrico in persone di età ≥55 anni	Esofago o stomaco	Considerare un'endoscopia del tratto gastrointestinale superiore [1.2.3][1.2.9]	Differibile
<b>Reflusso gastro-esofageo</b>			
Reflusso gastro-esofageo con calo ponderale in persone di età ≥55 anni	Esofago o stomaco	Richiedere un'endoscopia del tratto gastrointestinale superiore [1.2.1] [1.2.7]	Entro 2 settimane
Reflusso gastro-esofageo con trombocitosi o nausea o vomito in persone di età ≥55 anni	Esofago o stomaco	Considerare un'endoscopia del tratto gastrointestinale superiore [1.2.3] [1.2.9]	Differibile

<sup>§</sup>Le raccomandazioni per il carcinoma ovarico si applicano alle donne di età ≥18 anni.