

**Tabella 5. Dolore\***

Sintomi e segni	Sospetta neoplasia	Raccomandazione	Timing
Dolore ai linfonodi associato all'assunzione di alcool e a inspiegata linfadenopatia negli adulti	Linfoma di Hodgkin	Considerare un consulto specialistico per sospetta neoplasia, tenendo conto di eventuali sintomi associati [1.10.10]	Entro 2 settimane
Dolore osseo persistente in persone di età ≥60 anni	Mieloma	Richiedere un emocromo completo con formula, calcemia e VES [1.10.4]	Accesso diretto
Dolore toracico inspiegato con tosse o astenia o respiro corto o calo ponderale o perdita di appetito inspiegati in persone di età ≥40 anni	Polmone o mesotelioma	Richiedere una Rx torace [1.1.2] [1.1.5]	Entro 2 settimane
Dolore toracico inspiegato in fumatori o ex-fumatori di età ≥40 anni	Polmone o mesotelioma	Richiedere una Rx torace [1.1.2] [1.1.5]	Entro 2 settimane
Dolore toracico inspiegato in persone di età ≥40 anni che sono stati esposti all'asbesto	Mesotelioma	Richiedere una Rx torace [1.1.5]	Entro 2 settimane
Lombalgia associata a calo ponderale in persone di età ≥60 anni	Pancreas	Considerare una TAC o, se non disponibile, un'ecografia [1.2.5]	Entro 2 settimane
Lombalgia persistente in persone di età ≥60 anni	Mieloma	Richiedere un emocromo completo con formula, calcemia e VES [1.10.4]	Accesso diretto

\*Cfr. anche tabella 4 per dolore addominale o pelvico